PRIMERA EDICIÓN

"GUÍA ILUSTRADA DE AVES Y MAMÍFEROS FINCA LA PONDEROSA"

PENTAGONO DE LA BIODIVERSIDAD

FUNDACION TEJIDO AMBIENTAL

Fundación Tejido Ambiental de Colombia

Fundación Mujeres Bachué
El poder de creer y de crear

TIDES
A Force for Social Good

PENTAGONO DE LA BIODIVERSIDAD



Con el apoyo de

Fundación Tejido Ambiental de Colombia

Fundación Mujeres Bachué
El poder de creer y de crear

TIDES
A Force for Social Good

PENTAGONO DE LA BIODIVERSIDAD

PRESENTACIÓN

Medina, un municipio situado en el departamento de Cundinamarca y capital de la Provincia de Medina, es reconocido como "La Puerta del Llano". Se encuentra ubicado a 192 km al oriente de Bogotá. Con una extensión territorial de 1915 km², Medina es el municipio más amplio de Cundinamarca. Su cabecera municipal se eleva a una altitud de 520 m sobre el nivel del mar, y la temperatura media anual es de 25 °C.

La belleza de Medina reside principalmente en sus impresionantes paisajes naturales, caracterizados por majestuosas montañas, ríos cristalinos y cascadas enérgicas. Sus praderas verdes y vastos campos cultivados hacen de este lugar un destino ideal para el turismo rural y el ecoturismo.

Medina alberga un tesoro de biodiversidad que merece ser apreciado y protegido. En sus territorios conviven numerosas especies de plantas, bosques y vida silvestre, que llenan nuestro entorno de colores y sonidos. En este contexto, surge la "Guía de Biodiversidad Ilustrada de Aves y Mamíferos", elaborada como parte de la línea base de biodiversidad realizada en cada una de las cinco fincas que conforman el Pentágono de la Biodiversidad, este apoyo fue realizado por la fundación TIDES.


El proyecto se desarrolla en el municipio de Medina, Cundinamarca, abarcando las veredas **Gazaduje**, **Periquito**, **El Carmen**, **La Bodega** y **San Pedro de Guajaray**. La iniciativa de conservación conocida como "Pentágono de la Biodiversidad" surge del sueño compartido por cinco mujeres propietarias de cinco fincas en dicha localidad: Clara, Marcela, Sara, Diana Maritza y Sasha, estas mujeres realizan juntos sus familias, actividades que van desde la ganadería tradicional y regenerativa hasta la agricultura orgánica y regenerativa, conservación de especies silvestres como, mono churuco, el oso palmero, mono aullador, regeneración natural y protección de los bosques. Sin embargo, más allá de las actividades que se realizan en cada finca , lo que une a estas mujeres con las demás fincas es su objetivo común: la protección del bosque, su biodiversidad e identidad cultural local.

De esta manera, surge la estrategia del "Pentágono de la Biodiversidad", que se concentra en diseñar e implementar acciones para la conservación de la biodiversidad, fomentando la valoración de la cultura local y la aplicación de métodos tradicionales de agricultura regenerativa, con la visión de replicar estos modelos en las comunidades vecinas. Este propósito se materializa mediante la creación de corredores de conectividad, los cuales favorecen a la fauna que depende de bosques saludables y libres de intervención humana para su movilidad.

Cada finca del Pentágono asume el compromiso de trasmitir sus conocimientos a las comunidades locales, específicamente a los niños de las instituciones educativas rurales del territorio , con el fin último de preservar la riqueza biológica del municipio de Medina, Cundinamarca.

Para una mejor coordinación y enfoque, el Pentágono se divide en cinco ECO-regiones, con el propósito de abarcar estratégicamente los hábitats amenazados de la fauna silvestre:

- Región Norte: Representada por la Finca La Ponderosa.
- Región Cordillera: Representada por la finca la Fortuna
- Región Central: Representada por la Finca El Jardín del Gazaunta.
- Región Oriental: Representada por la Finca San Antonio.
- Región Sur: Representada por Villa Oso.



REGION NORTE

1. Finca la Ponderosa

REGION CORDILLERA

3. Finca la Fortuna

REGION SUR

5. Villa Oso

REGION CENTRAL

2. Finca el Jardin del Gazaunta

REGION ORIENTAL

4. Finca San Antonio

Marginal de la selva

Carretera Marginal de la selva

Investigadores y colaboradores

Clara Elizabeth Alfonso Franco
Diana Vanegas
Mario Abaunza
Juan Carlos Rivas Florez
Ersan urrea
Vitalia Gomez
Ananias Beltran
Raúl Alfonso
María Teresa Franco de Alfonso
Francisco José Piñeros Cortés

Ilustración

Ian Lewington.
Mark Hulme.
Hilary Burn.
Birds of the World
Juan Carlos Rivas Flórez

Investigadores y Edición

Juan Carlos Rivas Flórez - Biólogo
Mario Abaunza - Biólogo

Agradecimientos: Fundación Tides, Familia Alfonso y todos los propietarios de fincas visitadas para el levantamiento de línea base de aves y mamíferos en el municipio de Medina, por permitir el acceso a los sitios de estudio, proveer alimentación, estadía y toda su colaboración en el proceso.

NOTA

Queda estrictamente prohibida la comercialización de esta guía. La presente guía ha sido desarrollada con fines educativos y de consulta, y su venta o distribución con fines de lucro está totalmente vetada.

MAPA FISICO DE COLOMBIA



MAPA POLITICO DE CUNDINAMARCA

MAPA FISICO DE MEDINA

BIOMAS DE CUNDINAMARCA

REGION NORTE

Finca La Ponderosa se encuentra situada en la vereda Gazaduje, en el municipio de Medina, Cundinamarca, a lo largo de la margen derecha del río Gazaduje. Con un total de 3,39 kilómetros de senderos dentro de su área, esta finca ofrece la oportunidad de explorar y observar especies en diversos hábitats, que incluyen bosques riparios, potreros, vegetación ribereña y matorrales. La altitud de la finca oscila entre los 497 y 619 metros sobre el nivel del mar.


En la Finca La Ponderosa se han diseñado cuatro senderos para facilitar la identificación de la fauna local: el Alto, el Sendero Rio, el Sendero Peña, y el Sendero Manacus. Los visitantes pueden sumergirse en la belleza natural de un bosque nativo, disfrutar de las aguas cristalinas de un río con playas, y recorrer senderos especialmente marcados para la observación de aves, monos tities.



Piedemonte Amazónico - bosque húmedo con flora y fauna Amazónica.

El Sendero Manacus, con una extensión de 1 kilómetro, ofrece la oportunidad de identificar aves características de potreros, interior de bosque y bosques ribereños. Además, brinda la posibilidad de realizar observaciones matutinas para avistar el saltarín barbiblanco (Manacus manacus), así como otras especies. Este sendero es ideal para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan experiencias únicas de avistamiento de fauna en su hábitat natural.






El Sendero Alto, con una extensión de 0,97 km, transcurre a través de, potreros y un bosque nativo, caracterizado por un dosel que puede alcanzar zonas montañosas del predio. Este sendero se distingue por ser el más elevado del área y ofrece una experiencia excepcional de avistamiento de fauna. Durante el recorrido, es posible observar una amplia variedad de especies, incluyendo aves como hormigueros y oropéndolas, entre otras.





El Sendero Rio, con una longitud de o,48 km, ofrece una experiencia única de contacto con la naturaleza. A lo largo de este sendero, los visitantes tienen la oportunidad de avistar aves características de los ríos y disfrutar de diferentes áreas ideales para darse un refrescante baño en el río Gazaduje. Este río, de aguas cristalinas, proporciona el entorno perfecto para disfrutar de un baño revitalizante en un entorno natural y tranquilo. Además de observar la diversa avifauna, los visitantes pueden aprovechar para relajarse y disfrutar de un momento de conexión con la belleza natural que ofrece este entorno ribereño.





El Sendero Peña, con una longitud de 0,94 km, Este sendero se caracteriza por su ecotono, donde se encuentran árboles nativos que alcanzan hasta 15 metros de altura. Durante el estudio de la línea base de biodiversidad, se identificó esta zona del sendero como una ruta de paso constante para la fauna local. Por lo tanto, es un lugar ideal para los amantes de la observación de aves y aquellos interesados en la vida silvestre, ya que ofrece una alta probabilidad de avistar una variedad de especies en su hábitat natural.





Abreviaciones

Abreviaturas utilizadas en las laminas.

Hembra .....
Macho.....
Juvenil.....Juv.
Pichon.....P
Adulto.....Ad.
Especies.....Sp
Metros sobre el nivel del mar..... ms.n.m

Asociada a las diferentes especies

E	**Endémica:** Exclusiva de Colombia.
I	**Introducida:** Población exótica, con poblaciones silvestres en Colombia.
CE	**Casi endémica:** Especies a las que parte de su distribución se encuentra en Colombia y en otros paises.

Categorías Nacional de amenaza para especies

Amenazadas	Otras categorias
VU Vulnerable EN En Peligro	NT Casi Amenazado DD Datos deficientes LC Preocupación menor

Migración y comportamiento

MA Mp	Migratoria austral Migratoria parcial
MB	Migratoria boreal
	Nocturna
	Diurna

Alimentación

Granívoro
Frugívoro
Insectívoro
Carnívoro
Nectarívoro
Omnivíro
Carroñero
Piscívoro
Herbívoro

Hábitat

Bosque	Sabanas
Rebalse	Rios, caños, humedales y lagunas
Morichal	Afloramientos rocosos
Vegetación secundaria	Areas urbanas

Frecuencia de Avistamiento

Alta
Media
Baja
Rara
Sonido

Elementos para identificar fauna

Binoculares 8x42 o 10x42 y o camara fotografica
Guia de fauna, libreta de apuntes
iNaturalist eBird The Cornell Lab of Ornithology — Descarga las aplicaciones, Ebird, Merlin, enaturalist y xenocanto.
Ropa adecuada, sombrero o gorra, botas.

CINEREOUS TINAMOU

Crypturellus cinereus


ms.n.m 100-500

Tamaño 31cm/12in






LC



Común por voz, pero se ve con poca frecuencia en bosques inundados de aguas bajas y drenajes lentos de aguas revalsadas en todo el continente en el este, rara vez en grandes islas fluviales. Suele encontrarse en un sotobosque denso, donde reacciona rápidamente a las perturbaciones y pasa fácilmente desapercibido.

Camina a lo largo de vegetación caída, a menudo flotante, en bosques inundados, donde es difícil perseguirlo; generalmente parece completamente oscuro.



LITTLE TINAMOU

Crypturellus soui


ms.n.m 0-1500

Tamaño 22 cm/9in






LC



El tinamú más pequeño y popular, a menudo es común, pero nunca es fácil de ver en la maleza profunda de bosques secundarios y perturbados de tierras bajas. Evita los bosques maduros, especialmente. donde hay otros tinamú. Las hembras de todas las subespecies tienen bordes anteados en las cubiertas de las alas.



SPECKLED CHACHALACA

Ortalis guttata

ms.n.m100-1800

Tamaño 50cm/20in






LC



Común, vocal y visible en todo tipo de bosques y bordes de bosques en el este, extendiéndose hasta las estribaciones y, en algunos lugares, en los subtrópicos bajos.



GREY-FRONTED DOVE

Leptotila rufaxilla

ms.n.m 200-800

Tamaño 27cm/11in

LC



Común en tierras bajas y estribaciones. Suelo forestal del este, a menudo cerca del agua y generalmente no en el bosque de tierra firme bien drenado del Amazonas; vocal pero difícil de observar. Solitario o en parejas.



RUDDY GROUND-DOVE

Columbina talpacoti


ms.n.m 0-1200

Tamaño 18cm/7in

LC



Localmente poco común y poco visible en bosques secundarios y zonas arboladas; menos común en zonas más húmedas, por ejemplo en las tierras bajas del sur del Amazonas; Es terrestre cuando se alimenta, pero generalmente se lo ve posado en lo bajo de los árboles.



BLUE GROUND-DOVE

Claravis pretiosa


ms.n.m 0-2400

Tamaño 27cm/11in

LC



Común en tierras bajas y estribaciones. Suelo forestal del este, a menudo cerca del agua y generalmente no en el bosque de tierra firme bien drenado del Amazonas; vocal pero difícil de observar. Solitario o en parejas.



WHITE-TIPPED DOVE

Leptotila verreauxi

ms.n.m 0-2800

Tamaño 28cm/11in



Común y ampliamente distribuida en Centro y Suramérica. Se encuentra en hábitats arbolados. A veces, visita comederos de aves, de lo contrario es muy tímida. Generalmente se observa en el suelo dentro del bosque. El canto comienza con un silbido introductorio seguido de una nota hueca más larga.



RUDDY GROUND-DOVE

Geotrygon montana

ms.n.m200-1500

Tamaño 23cm/9in



La mayoría de las veces se le observa al volar aparatosamente al casi pisarla, o volando bajo al cruzar veredas muy tranquilas. El macho con su color rojizo brillante, es distintivo. La hembra es café con rastros del patrón facial del macho y una barra vertical pálida a los lados del pecho; tampoco tienen las puntas blancas de la cola presentes en otras palomas como White-tipped Dove y especies afines.



SQUIRREL CUCKOO

Piaya cayana

ms.n.m 0-2800

Tamaño 45cm/18in



Generalmente se alimenta sigilosamente en los estratos medios y altos de los árboles, donde puede ser sorprendentemente difícil de ver. Puede encontrarse atravesando en picada los caminos, causando sorpresa. La parte inferior de las plumas de la cola, que tienen puntas blancas, es canela en el Oeste de México y negra en las demás regiones.



SPOT-TAILED NIGHTJAR


Hydropsalis maculicaudus

ms.n.m500-1200

Tamaño 20cm/8in



Como todos los tapacaminos, el reflejo de la luz en sus ojos es ámbar-rojizo. Su plumaje es similar al de otros tapacaminos, pero hay que notar la ceja beige pálido, una línea beige con forma de V en la espalda y y puntos muy marcados en las alas. El macho tiene la punta de la cola blanca, la hembra no. Los puntos blancos en la cola del macho usualmente sólo se ven con el ave en la mano. Su canto es alto y similar a un insecto, difícilmente llama la atención.




CHESTNUT-COLLARED SWIFT

Streptoprocne rutila

ms.n.m 800-2800

Tamaño 14cm/51⁄2in



Suele verse en parvadas, a veces asociado con golondrinas u otros vencejos. Parece ser negro a menos que se le vea a corta distancia, siendo entonces posible ver el collar castaño (ausente en los inmaduros). Note también la voz: un parloteo chispeante que suena como electricidad pasando por cables.




GREY-RUMPED SWIFT


Chaetura cinereiventris

ms.n.m 1000-2500

Tamaño 11cm/4in



Generalmente se ve en bandadas, a veces bastante grandes, alimentándose sobre hábitats como bosques, claros, áreas abiertas y lagos.



FORK-TAILED PALM SWIFT

Tachornis squamata

ms.n.m 200-1000

Tamaño 13cm/5in



A menudo se lo ve en grupos e invariablemente cerca de rodales de palmeras, en zonas urbanas y rurales, en las cuales anidan. Roba plumas de otras aves vivas en vuelo.




RUFOUS-BREASTED HERMIT

Glaucis hirsutus

ms.n.m 0-1100

Tamaño 10cm/4in



Bastante común en crecimiento secundario espeso en tierras bajas y estribaciones; cerca del agua en la Amazonia, no tan estrictamente en Magdalenia. Visita Heliconia.



GLITTERING-THROATED EMERALD

Chionomesa fimbriata

ms.n.m 100-1200

Tamaño 8.5cm/3¼in



Común en el borde del bosque, áreas semiabiertas, plantaciones y jardines en las estribaciones y tierras bajas del este. Generalmente se encuentra bajo.




SOUTHERN LAPWING


Vanellus chilensis

ms.n.m 0-2600

Tamaño 35cm/14in



Común en pastizales de tierras bajas del norte y este, con menos frecuencia en bancos de arena; Cada vez es más común en las tierras altas, en pueblos, parques y terrenos en barbecho. Grupos pequeños; vocal cuando se le molesta y cuando vuela.



RUFESCENT TIGER-HERON


Tigrisoma lineatum

ms.n.m 0-1000

Tamaño 75cm/30in



Esta garza de tamaño mediano es encontrada alrededor de pantanos y arroyos lentos. Los adultos son distintivos con su brillante cabeza y cuello ferruginoso. Los juveniles son beige con barras negras desiguales; muy similar a juvenil de Fasciated Tiger-Heron. Usualmente visto solo.



WHISTLING HERON

Syrigma sibilatrix

ms.n.m 0-400

Tamaño 58cm/23in



Garza multicolor, con una gorra oscura, cuello pálido y un pico rosado con punta negra que contrasta con su anillo ocular azul. A menudo se encuentra en áreas más secas que otras garzas, como pastizales naturales y áreas agrícolas, pero también a veces se encuentra en pantanos. A diferencia de otras garzas, es bastante vocal; con frecuencia produce un silbido metálico distintivo.




CATTLE EGRET

Bubulcus ibis

ms.n.m 0-800

Tamaño 50cm/20in



Amplia y abundante, pastos y praderas, a menudo no cerca del agua; no acuático; gregario, recoge presas terrestres móvil, llamativo, a menudo con ganado.




Orden: Pelecaniformes Familia: Threskiornithidae

SCARLET IBIS

Eudocimus ruber

ms.n.m 0-600

Tamaño 60cm/24in



Inconfundible, hermoso ibis rojo anaranjado con las puntas de las alas negras. Los adultos en plumaje reproductivo tienen picos negros. El pico es rosado en otros períodos. Los inmaduros son oscuros arriba con vientres blancos y picos rosados. Restringido a manglares y estuarios fangosos adyacentes.



GREEN IBIS

Mesembrinibis cayennensis

ms.n.m 0-800

Tamaño 58cm/23in



Localmente bastante común a lo largo de arroyos y lagos boscosos en el norte y el este, más ligado al bosque que otros ibis, no a menudo en espacios abiertos; La mayoría de las veces se localiza al sonar el canto del amanecer.




Los ibis vistos con mayor frecuencia en Colombia, campos, pantanos, áreas abiertas inundadas, pero no áreas densamente boscosas o manglares; Grupos grandes, se asocia libremente con otras aves. Poco frecuente en altitudes más altas.


BARE-FACED IBIS

Phimosus infuscatus

ms.n.m 0-2600

Tamaño 52cm/21in





Orden: Cathartiformes Familia: Cathartidae

BLACK VULTURE


Coragyps atratus

ms.n.m 0-3600

Tamaño 65cm/25in



Omnipresente, común y visible en todas partes; gregarios, en grandes cantidades se reúnen en corrientes ascendentes en las tierras bajas.



TURKEY VULTURE

Cathartes aura

ms.n.m 0-3400

Tamaño 75cm/30in



Común en todas partes; en el sureste, principalmente en las estribaciones, y se extienden únicamente a lo largo de los ríos principales.




DOUBLE-TOOTHED KITE

Harpagus bidentatus

ms.n.m 0-3500

Tamaño 60cm/24in



Rara vez se le ve perchado, aunque puede ser muy manso. Al verlo de cerca, note tres barras blancas angostas en la cola y una línea vertical negra en el centro de la garganta. La orilla cortante lateral del pico tiene una doble muesca (de ahí el nombre Bidentado) que rara vez es visible.




ROADSIDE HAWK

Rupornis magnirostris

ms.n.m 0-3000

Tamaño 38cm/15in



Un halcón común en tierras bajas y bosques subtropicales y áreas perturbadas. A menudo se le ve deslizándose por áreas abiertas, pero no sueña con regularidad; cola generalmente cerrada en vuelo.




BROAD-WINGED HAWK

Buteo platypterus

ms.n.m 0-3000

Tamaño 42cm/17in



Conocido por formar bandadas masivas llamadas azacuanes durante la migración, cuando viaja desde Estados Unidos y Canadá hasta Centro y Suramérica.




SWAINSON'S HAWK

Buteo swainsoni

ms.n.m 500-2100

Tamaño 55cm/22in



En vuelo desde abajo, observa las primarias y secundarias oscuras que contrastan con lo blancuzco de la parte delantera del ala en la forma clara. Pasa el invierno mayormente en Suramérica, con números bajos en tierras bajas del Pacifico en México y Centroamérica.



AMAZONIAN MOTMOT

Momotus momota

ms.n.m 200-1400

Tamaño 40cm/16in



Generalmente lo más común tragón en bosques de tierras bajas en el este, visto en tierra firme, bosques inundados y ribereños en todas las alturas. Anteriormente incluido en Trogón de cola blanca.



RINGED KINGFISHER

Megaceryle torquata

ms.n.m 0-2500

Tamaño 40cm/16in



Común en lagos y ríos abiertos más grandes en tierras bajas y deambulando hacia tierras altas; raramente en agua salada. Prefiere aguas más abiertas que el martín pescador Chloroceryle. A veces flota cuando pesca; descansa sobre cables.



SWALLOW-WINGED PUFFBIRD

Chelidoptera tenebrosa

ms.n.m 0-2500

Tamaño 17cm/7in



A menudo se lo ve posado en cercas y cables eléctricos a lo largo de carreteras en zonas con matorrales así como en bordes de bosque. También encontrado cerca de terraplenes de arena donde anidan en madrigueras. Su cuerpo es mayormente azul marino con vientre rojizo, donde las coberteras subcaudales, la rabadilla y las alas son blancas. Mientras realiza vaivenes aéreos, muestra sus largas y anchas alas así como sus separados "dedos" alares.



BROWN JACAMAR

Brachygalba lugubris

ms.n.m 200-1200

Tamaño 16cm/6 1⁄2in



LC



Localmente bastante poco común en crecimiento a orillas del agua, como densos rodales de bambú, a lo largo de los principales ríos en las tierras bajas del este. Los grupos familiares pequeños suelen permanecer bajos y pasan desapercibidos entre la maleza.



CHESTNUT-EARED ARACARI


Pteroglossus castanotis

ms.n.m 100-1200

Tamaño 45cm/18in



LC



Bastante común, sobre todo en bosques ribereños detierras bajas y estribaciones del este; Visita islas fluviales. Busca alimento en parejas y en grupos pequeños y activos.



Individuos solitarios, parejas o pequeñas bandadas son encontrados en el dosel del bosque, a menudo cerca de árboles con frutos. Su nombre en inglés se deriva de la ranura en la parte superior del pico, que es difícil de ver en el campo.


CHANNEL-BILLED

Ramphastos vitellinus

ms.n.m 0-1700

Tamaño 45cm/18in

LC





Común en hábitats secundarios más secos en tierras bajas del este hasta los subtrópicos; también en el Catatumbo y la sierra de Santa Marta. Busca alimento en alturas bajas o medias, a menudo con bandadas mixtas.

SCALED PICULET


Picumnus squamulatus

ms.n.m 100-1900

Tamaño 9cm/3½in

LC





YELLOW-TUFTED WOODPECKER

Melanerpes cruentatus

ms.n.m 100-1200

Tamaño 19cm/7½in

LC





Común en secundaria y bosque semiabierto, plantaciones arboladas maduras. Generalmente en parejas dispersas que prefieren troncos más grandes. Puede ocurrir junto con pájaros carpinteros Campephilus similares.

LINEATED WOODPECKER

Dryocopus lineatus

ms.n.m 0-2200

Tamaño 35cm/14in

LC





Ampliamente distribuido pero generalmente poco común; se encuentra en una variedad de hábitats boscosos abiertos y bordes, incluyendo bosques secundarios y jardines. La llamada más frecuentemente escuchada es una serie de notas, "pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi".


SPOT-BREASTED WOODPECKER

Colaptes punctigula

ms.n.m 0-1500

Tamaño 20cm/8in

LC





No planea. Vuela con prisa y aleteos tensos, exponiendo sus manchas color cobre bajo las alas. Su llamado parece una carcajada a lo lejos.

LAUGHING FALCON

Herpetotheres cachinnans

ms.n.m 0-2500

Tamaño 50cm/20in





LC



Áreas abiertas en el norte y al este, a menudo a lo largo de ríos, bancos de arena, nunca bosques; grupos; busca y mata cosas fáciles.


YELLOW-HEADED CARACARA

Daptrius chimachima

ms.n.m 0-3000

Tamaño 44cm/18in





LC



Frecuentemente anda en pares o grupos y se encuentra a menudo cerca de los humanos en áreas agrícolas y pueblos ribereños.

BLACK CARACARA

Daptrius ater

ms.n.m 100-1000

Tamaño 46cm/17in





LC



Periquito verde con una cola corta. Las plumas azules del ala son difíciles de ver cuando están perchados, pero son conspicuas en vuelo.

COBALT-WINGED PARAKEET

Brotogeris cyanoptera

ms.n.m 0-900

Tamaño 20cm/8in





LC



Periquito verde con una cola corta. Las plumas azules del ala son difíciles de ver cuando están perchados, pero son conspicuas en vuelo.



WHITE-EYED PARAKEET

Psittacara leucophthalmus

ms.n.m 0-1000

Tamaño 34cm/13in




LC





Periquito verde con una cola corta. Las plumas azules del ala son difíciles de ver cuando están perchados, pero son conspicuas en vuelo.


Más bien local en el sotobosque de los bosques y en los bordes de los bosques con matorrales en las estribaciones nororientales y las tierras bajas adyacentes. Generalmente en parejas, rara vez se unen a bandadas mixtas.

BLACK-CRESTED ANTSHRIKE


Sakesphorus canadensis

ms.n.m 0-900

Tamaño 16cm/6 1⁄2in



LC



Más bien local en el sotobosque de los bosques y en los bordes de los bosques con matorrales en las estribaciones nororientales y las tierras bajas adyacentes. Generalmente en parejas, rara vez se unen a bandadas mixtas.

Un hormiguerito diminuto con una cola muy corta. Parece una pelota de ping-pong rebotando en los niveles medios y el dosel del borde y bosque de tierras bajas.

NORTHERN SLATY-ANTSHRIKE

Thamnophilus punctatus

ms.n.m 200-1500

Tamaño 15cm/6in



LC



Esta ave merodeadora vive en tierras bajas tropicales húmedas, prefiriendo matorrales y zarzales en bordes de bosque al lado de corrientes de agua. Su canto de silbidos aflautados suele escucharse y revelar su presencia, generalmente en parejas aunque son difíciles de ver claramente.


MOUSTACHED ANTWREN

Myrmotherula ignota

ms.n.m 0-1000

Tamaño 7.5cm/3in






Bastante común en los claros de caída de árboles y en la maleza del borde del bosque del estre tierras bajas, más a menudo en bosques inundados que en tierra firme.

DUSKY ANTBIRD

Cercomacroides tyrannina

ms.n.m 0-1900

Tamaño 15cm/6in



LC

WHITE-BROWED ANTBIRD


Myrmoborus leucophrys

ms.n.m 100-1700

Tamaño 13.5cm/5 1⁄4i



LC




Ampliamente distribuido en las tierras bajas del norte de Suramérica, al este de los Andes, hasta alrededor de 1000 m.

SPOT-WINGED ANTBIRD


Myrmelastes leucostigma

ms.n.m 0-1900

Tamaño 15cm/6in



LC



Pájaro pequeño de cola larga que se encuentra en matorrales. Gris claro con alas y cola marrón rojizo. La garganta clara sin negro ayuda a distinguirlo de especies similares. Se encuentra cerca de bordes de bosque, así como también cerca de jardines. Dentro de su género, es la especie más común en la mayor parte del rango; a menudo se escucha cantar durante todo el día, un repetido "¡piu ... put UIIT!"

PLAIN-CROWNED SPINETAIL

Synallaxis gujanensis

ms.n.m 100-1200

Tamaño 16cm/6¼in










Común en el sotobosque espeso y enredado del bosque húmedo localmente hasta las estribaciones; leks 1-2m arriba.

WHITE-BEARDED MANAKIN


Manacus manacus

ms.n.m 0-1000

Tamaño 11cm/4½in





Pájaro pequeño y rechoncho, de cola corta, de tierras bajas y bosque de estribaciones. El macho es distintivo, tiene una corona de color rojo brillante y rayas blancas contrastantes en el vientre rojizo. La hembra carece de la corona roja, pero a diferencia de cualquier otro manakin muestra rayas tenues en los costados. Discreto; la elaborada danza de cortejo es vista con poca frecuencia. Se encuentra en los niveles inferiores a medios del bosque. Escucha por su canto agudo, suave y silbado "ch-peew" en gran parte de su rango, pero nota que la población en el este de Brasil emite un canto más fuerte y más bajo.

STRIPED MANAKIN


Machaeropterus striolatus

ms.n.m 200-1500

Tamaño 9cm/3½in







Bastante común en dosel de bosques alterados y semiabiertos hasta los subtrópicos inferiores; a menudo se posa sobre troncos.

BLACK-CROWNED TITYRA

Tityra inquisitor

ms.n.m 0-1200

Tamaño 18cm/7in





Cabezón mediano, encontrado en bordes de bosques húmedos, zonas boscosas y bosques de galería donde tiende a posarse en ramas expuestas.

CHESTNUT-CROWNED BECARD

Pachyramphus castaneus

ms.n.m 0-1700

Tamaño 14cm/5½in





Cabezón de bosque húmedo, los machos son gris oscuro pizarroso con garganta rosada y las hembras son marrón-anaranjadas con “gorra” gris que se extiende hasta la parte posterior del cuello. Encontrado solo o en parejas en el sotobosque superior y en el dosel del bosque lluvioso maduro, donde frecuentemente se une a bandadas mixtas de tangaras, monjas y otras aves.


PINK-THROATED BECARD

Pachyramphus minor

ms.n.m 100-500

Tamaño 18cm/7in





Mosquerito merodeador de matorrales y arbustos enredados en tierras bajas tropicales húmedas. Brinca por los alrededores, como si fuera un chipe lento, a veces quedándose quieto por largos periodos.

SLATE-HEADED TODY-FLYCATCHER

Poecilotriccus sylvia

ms.n.m 100-1350

Tamaño 9.5cm/3¾in






Bastante común en niveles medios en bosques y bordes y áreas más ligeramente boscosas, evitando generalmente los bosques muy húmedos en la mayor parte del norte y centro del país y los llanos; con bandadas mixtas.


YELLOW-OLIVE FLYCATCHER

Tolmomyias sulphurescens

ms.n.m 0-1800

Tamaño 14cm/5½in





Bastante común en bosques abiertos y ribereños, también rodales de bambú e incluso matorrales espinosos en el norte y la mayor parte de las tierras bajas del este, localmente hasta el Bastante común en bosques más abiertos e inundados en las tierras bajas del Amazonas.


YELLOW-BREASTED FLYCATCHER

Tolmomyias flaviventris

ms.n.m 0-800

Tamaño 12.5cm/5in






Común en zonas húmedas y semihúmedas. cubierta forestal y bordes. Un ave solitaria que no se une a bandadas mixtas, se posa durante largos períodos en ramitas altas y troncos, llamando.

YELLOW-CROWNED TYRANNULET

Tyrannulus elatus

ms.n.m 0-1100

Tamaño 10.5cm/41⁄4i





Este mosquero es detectado con mayor frecuencia por su llamada, un penetrante "pii-suiit" dividido en dos partes.


FOREST ELAENIA

Myiopagis gaimardii

ms.n.m 0-1500

Tamaño 12.5cm/5in





Flycatcher bastante grande con pico largo y ganchudo. Marrón con garganta gris pálida, vientre amarillo pálido, y bordes rojizos en las plumas de vuelo y cola. Parecido a Ash-throated Flycatcher pero tiene pico más largo y sus vocalizaciones son diferentes.

BROWN-CRESTED FLYCATCHER

Myiarchus tyrannulus

ms.n.m 0-1700

Tamaño 20cm/8in





Mosquero más abultado pero pequeño, común en las zonas tropicales de baja altitud. Suele encontrarse en claros cubiertos de malezas, sabanas, y otras áreas semi-abiertas con arbustos dispersos.

YELLOW-BELLIED ELAENIA

Elaenia flavogaster

ms.n.m 0-2500

Tamaño 16cm/61⁄2in





Grande, fuertemente marcado y bullicioso. Bastante rechoncho con cabeza grande y cola corta. Se encuentra en áreas llenas de arbustos, a menudo cerca de zonas abiertas o cuerpos de agua.


GREAT KISKADEE

Pitangus sulphuratus

ms.n.m 0-1600

Tamaño s 20cm/8in






Localmente bastante común en el bambú.
Mosquero grande y llamativo del bosque tropical y subtropical a baja altitud; también en áreas semi-abiertas con árboles altos. Se percha desde el medio hasta arriba de los árboles en el follaje.


BOAT-BILLED FLYCATCHER

Megarynchus pitangua

ms.n.m 0-1900

Tamaño 23cm/9in






Uno de varios mosqueros de tamaño mediano, como un kiskadee, de color amarillo brillante, con patrón contrastante de la cabeza en blanco y negro.

RUSTY-MARGINED FLYCATCHER

Myiozetetes cayanensis

ms.n.m 0-2000

Tamaño 17cm/7in





Migratorio de verano poco común en tierras bajas tropicales y estribaciones. Prefiere bordes de bosques, plantaciones y claros con árboles altos.

Flycatcher grande de vientre amarillo con cabeza gris, espalda verdosa y alas y cola marrones. Pico relativamente largo. Casi idéntico a Couch's Kingbird y muy similar a otros kingbirds de vientre amarillo.

PIRATIC FLYCATCHER

Legatus leucophaius

ms.n.m 0-1600

Tamaño 15cm/6in





TROPICAL KINGBIRD

Tyrannus melancholicus

ms.n.m 0-2800

Tamaño 22cm/8¾in





Uniformemente verde oliva arriba, blancuzco abajo y sin barras alares. El rojo de los ojos en los adultos no siempre es fácil de ver; los inmaduros tienen ojos marrones. Línea oscura a través de y arriba del ojo. Pico más grueso que las reinitas, cuerpo casi del mismo tamaño. Se encuentra en áreas boscosas con árboles caducifolios. Tiende a cantar más tarde en el día que otras aves canoras.


RED-EYED VIREO

Vireo olivaceus

ms.n.m 100-500

Tamaño 14.5cm/5¾in






Ave grande y oscura con un plumaje azul vibrante y una cabeza y un babero negros. Frecuenta una variedad de hábitats abiertos, incluyendo bordes de bosques, jardines y áreas agrícolas. A menudo es particularmente común en la vegetación a lo largo de ríos y caminos acuáticos. Se distingue de la similar Purplish Jay por su brillante plumaje azul y su contraste nuca pálida. También escucha por un penetrante y agudo "jiir".

VIOLACEOUS JAY

Cyanocorax violaceus

ms.n.m 200-1350

Tamaño 36cm/14in





Orden: Passeriformes Familia: Corvidae


Golondrina uniformemente marrón, común y ampliamente distribuida por los Neotrópicos. Muy similar a Northern Rough-winged Swallow. Busca la rabadilla pálida contrastante en vuelo y la garganta de color rojizo. Se encuentra en una variedad de hábitats abiertos, incluyendo pastizales, ríos y lagos, a menudo en pequeñas bandadas dispersas.

SOUTHERN ROUGH-WINGED SWALLOW

Stelgidopteryx ruficollis

ms.n.m 0-600

Tamaño 13cm/5in





Orden: Passeriformes Familia: Hirundinidae

Soterrey oscuro y de cola corta, bastante tímido y difícil de ver. En general marrón con la garganta gris pálido y un pico relativamente largo y recto. Algunas poblaciones tienen más hojuelas en el pecho que otras.

En casa en los suburbios, parques, granjas y otras áreas abiertas con matorrales densos. En la temporada de reproducción, a menudo está cantando su canto efervescente desde la parte superior de un arbusto o un poste de la cerca.


SCALY-BREASTED WREN

Microcerculus marginatus

ms.n.m 0-1800

Tamaño 10cm/4in





HOUSE WREN

Troglodytes aedon

ms.n.m 0-3200

Tamaño 12cm/4¾in





Orden: Passeriformes Familia: Troglodytidae

Orden: Passeriformes Familia: Troglodytidae

Un soterrey de tamaño medio encontrado desde el este de Panamá a lo largo de gran parte de las tierras bajas de Suramérica. Tiene las partes superiores cálidas, medio marrones, con barras oscuras en las alas y la cola. Las pálidas mejillas y garganta blancuzcas se desvanecen en un vientre beige. También nota la ceja blanca obvia. Los pares son encontrados en los niveles más bajos de bosques de tierras bajas, bosque secundario y áreas ribereñas.

BUFF-BREASTED WREN

Cantorchilus leucotis

ms.n.m 0-600

Tamaño 14cm/51⁄2in





Orden: Passeriformes Familia: Turdidae

Un zorzal de pocos colores, común en hábitats abiertos y arboledas en las tierras bajas, pero también vagabundea en las estribaciones andinas. Mayormente marrón-grisáceo con el vientre blancuzco.


BLACK-BILLED THRUSH

Turdus ignobilis

ms.n.m 200-2600

Tamaño 23cm/9in





Orden: Passeriformes Familia: Turdidae


Ave diminuta con pico robusto y cola corta. Los machos tienen la cabeza, la espalda y la garganta de color negro azulado brillante, su frente y su vientre amarillo brillante y su cola blanca. Las hembras son verde-oliva por encima con el vientre amarillento o blanco, el cual está flanqueado de amarillo dependiendo de su rango de distribución.


THICK-BILLED EUPHONIA

Euphonia laniirostris

ms.n.m 200-2200

Tamaño 11.5cm/41⁄2i





Orden: Passeriformes Familia: Fringillidae


Gorrión fornido con cuerpo gris, espalda verde y rayas negras en la cabeza. Separado de otros gorriones y pinzones por el patrón de la cabeza.

BLACK-STRIPED SPARROW

Arremonops conirostris

ms.n.m 200-1650

Tamaño 16cm/61⁄4in




Bastante común pero poco visible en el sotobosque de los bosques; en o cerca del suelo.

PECTORAL SPARROW

Arremon taciturnus

ms.n.m 100-1100

Tamaño 16cm/61⁄4in






Común y notable principalmente en cubierta forestal de tierras bajas y estribaciones; grande grupos, con bandadas mixtas de oropéndolas.

CRESTED OROPENDOLA

Psarocolius decumanus

ms.n.m 0-2600

Tamaño 46cm/18in



Común en bosques húmedos y bordes, principalmente en Tierras Bajas; grupos conspicuos, a menudo con oropéndolas.

YELLOW-RUMPED CACIQUE

Cacicus cela

ms.n.m 0-3500

Tamaño 28cm/11in






El color del pico es variable: negruzco oscuro en las tierras bajas amazónicas y generalmente amarillento en los Andes.

RUSSET-BACKED OROPENDOLA

Psarocolius angustifrons

ms.n.m 0-2500

Tamaño 48cm/19in




Oropéndola grande y oscura del bosque lluvioso maduro. Verde oliva con alas marrón rojizo y una cola amarilla brillante.

OLIVE OROPENDOLA

Psarocolius bifasciatus

ms.n.m 0-1000

Tamaño 53cm/21in



Orden: Passeriformes Familia: Parulidae


Migrante boreal común hacia los bordes de los bosques y las plantaciones; con bandadas mixtas del sotobosque. Se reproduce en bosques caducifolios (maduros y secundarios). Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

AMERICAN REDSTART


Setophaga ruticilla

ms.n.m 0-3000

Tamaño 12.5cm/5in



LC MB








Las aves en plumaje no reproductivo y las hembras son más opacas; pero la mayoría muestran al menos un poco de color castaño en los lados. Las aves más opacas son parecidas a Blackpoll y Pine Warblers; observa las estrías en la espalda, barras del ala bien definidas, cabeza y cuello amarillo verdoso más uniforme.

BAY-BREASTED WARBLER

Setophaga castanea

ms.n.m 0-1000

Tamaño 13cm/5in



LC MB





Orden: Passeriformes Familia: Parulidae

Un abundante migrante boreal en bosque y borde del bosque; con bandadas mixtas. Se reproduce en áreas boscosas, que van desde bosques de pino-roble en el sureste de Estados Unidos hasta corredores riparios en el norte de México y oeste de EE.UU. Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

SUMMER TANAGER


Piranga rubra


ms.n.m 0-1800

Tamaño 18cm/7in



LC MB







Orden: Passeriformes Familia: Cardinalidae

SILVER-BEAKED TANAGER

Ramphocelus carbo

ms.n.m 100-1200

Tamaño 17cm/6¾in



LC



Una tángara común del sotobosque de áreas suburbanas y bordes de bosque. El brillante pico plateado se destaca en los machos rojo y negro, pero el pico gris de las hembras e inmaduros uniformemente granate es menos obvio.





Orden: Passeriformes Familia: Thraupidae


Un generalista de hábitat, se encuentra en una variedad de áreas abiertas con arbustos, jardines o bordes de bosques. Usualmente en parejas o pequeñas bandadas, a veces mezclados con otras especies. A menudo bastante ruidoso y conspicuo, emite una serie de chirridos o una sola llamada nasal "swii?".

PALM TANAGER

Thraupis palmarum

ms.n.m 0-2200

Tamaño 16cm/61⁄2in






Suele alimentarse de frutas en la parte alta y media de los arboles. Se percha en los cables.


BLUE-GREY TANAGER

Thraupis episcopus

ms.n.m 0-2600

Tamaño 16cm/61⁄2in





Tangara común de sabanas, bordes de bosque, arboledas y jardines. A menudo se observa en parejas o con otras especies en árboles con frutos, pero usualmente no anda con bandadas de especies mixtas.


Tangara llamativa que se encuentra en el dosel en los bordes de bosques, plantaciones y jardines. Principalmente se observa en pares o pequeños grupos de una sola especie. Dependiendo de la luz, puede parecer oscura, pero tiene la cara azul oscuro, con un parche negro delante del pico y flancos azules con manchas negras.

BURNISHED-BUFF TANAGER

Stilpnia cayana

ms.n.m 200-2600

Tamaño 13cm/5in






TURQUOISE TANAGERR

Tangara mexicana

ms.n.m 100-1000

Tamaño 13cm/5in






Se percha en posición vertical, a menudo en ramas expuestas o en las copas de árboles, y sale en busca de insectos como un mosquero. Usualmente se ve en parejas o pequeños grupos dispersos. Se encuentra en los bordes del bosque, claros o jardines.

SWALLOW TANAGER

Tersina viridis

ms.n.m 0-2800

Tamaño 13.5cm/51⁄4i







Usualmente se ven en pares o pequeños grupos en el dosel de bosques, bordes y bosque secundario. A menudo sigue bandadas de forrajeo de especies mixtas. Se alimenta de frutas.


BLUE DACNIS

Dacnis cayana

ms.n.m 0-1100

Tamaño 12.5cm/5in







CHESTNUT-VENTED CONEBILL


Conirostrum speciosum

ms.n.m 100-700

Tamaño 11cm/41⁄2in







Común en áreas abiertas, corto pastos, fincas poblados hasta la elevación de Bogotá.

Típicamente se encuentran en pares, no en bandadas como a menudo se encuentran los semilleros.


SAFFRON FINCH

Sicalis flaveola

ms.n.m 0-2700

Tamaño 13cm/5in









CHESTNUT-BELLIED SEED-FINCH

Sporophila angolensis

ms.n.m 100-1500

Tamaño 12.5cm/5in







Bastante común en tierras bajas tropicales húmedas. Prefiere bordes de bosques, plantaciones y bosque secundario denso. Usualmente visto solo o en pares, alimentándose tranquilamente en árboles en flor o en fructificación.


BUFF-THROATED SALTATOR

Saltator maximus

ms.n.m 100-1700

Tamaño 21cm/81⁄2in







Este armadillo relativamente grande está restringido a los bosques tropicales húmedos de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. En las zonas de sabana está restringido a los parches de bosque. La especie construye madrigueras en suelo bien drenado. Las hembras suelen dar a luz a dos crías (Eisenberg 1989).

ARMADILLO DE NARIZ GRANDE

Dasypus kappleri

ms.n.m 200-1250

Tamaño 51 a 58 cm





LC



Las pacas tienen hábitos nocturnos. Van solitarias o en parejas. Se alimentan de vegetales (tubérculos, rizomas, vástagos, hojas, semillas, frutos). Pasan el día en su madriguera construida con varias salidas disimuladas por el follaje. No se alejan demasiado de sus madrigueras y son animales territoriales. Son excelentes corredoras y nadadoras.

LAPA

Cuniculus paca

ms.n.m 0-2000

Tamaño 60 a 79 cm



LC





Localizan a la presa principalmente por el olor, teniendo una vista relativamente pobre. Una vez localizada la persiguen hasta que esta se cansa. El hurón mayor es un omnívoro oportunista, consumiendo una variedad de frutos, carroña, pequeños vertebrados, insectos y miel.

ULAMA

Eira barbara

ms.n.m 0-1200

Tamaño 70 cm



LC





Orden: Cingulata Familia: Dasypodidae

Orden: Rodentia Familia: Cuniculidae

Orden: Carnivora Familia: Mustelidae

Orden: Rodentia Familia: Sciuridae

Los nidos pueden ser construidos con hojas (Nitikman, 1985). El periodo de gestación y lactancia dura entre 15 y 16 semanas. Las crías nacen sin pelo y con los ojos cerrados. El número de embriones puede ser de dos o tres (Enders, 1935; Nitikman, 1985). La reproducción podría depender de la disponibilidad de frutos (Glanz et al., 1982). Un individuo se registró con una duración de vida de hasta seis años (Nitikman, 1985).

ARDILLA DE COLA ROJA

Sciurus granatensis

ms.n.m 0-3700

Tamaño 22 cm



LC





El oso hormiguero gigante se encuentra en gran variedad de hábitats, en sabanas, pastizales, áreas pantanosas, bosques húmedos, bosques secos, siendo más frecuente en áreas abiertas con abundancia de hormigas y termitas, las cuales componen esencialmente su dieta (mirmecofagia).

Orden: Pilosa Familia: Myrmecophagidae

OSO PALMERO

Myrmecophaga tridactyla

ms.n.m 0-2000

Tamaño 50 a 180 cm



VU





El oso melero es principalmente nocturno pero ocasionalmente activo diurno. Es común hallarlo en su nido durante el día en huecos de árboles o en cuevas de otros animales. Son solitarios. Se pueden comunicar cuando se buscan por celo y emitir un fétido olor por una glándula anal.

OSO MELERO

Tamandua tetradactyla

ms.n.m 0-1000

Tamaño 34 – 88 cm



LC






Por lo general se congregan en grupos que en promedio tienen 6 animales, pero se han observados en grupos más grandes de hasta 16 individuos, en territorios de entre 4 y 182 ha. Adoptan principalmente la posición cuadrúpeda y lo hacen en un 80% de las veces mientras se desplazan.

MONO TITI

Saimiri cassiquiarensis albigena

ms.n.m 200-1200

Tamaño 25 a 37 cm



LC





NOTAS

Registro de aves en la finca

Fecha	Hora	Especie	Actividad	Caracteristicas

NOTAS

Registro de mamiferos en la finca

Fecha	Hora	Especie	Actividad	Caracteristicas

NOTAS

NOTAS

NOTAS