




"GUÍA ILUSTRADA DE AVES Y MAMÍFEROS FINCA SAN ANTONIO"



PENTAGONO DE LA BIODIVERSIDAD

FUNDACION TEJIDO AMBIENTAL





Con el apoyo de



PRESENTACIÓN

Medina, un municipio situado en el departamento de Cundinamarca y capital de la Provincia de Medina, es reconocido como "La Puerta del Llano". Se encuentra ubicado a 192 km al oriente de Bogotá. Con una extensión territorial de 1915 km², Medina es el municipio más amplio de Cundinamarca. Su cabecera municipal se eleva a una altitud de 520 m sobre el nivel del mar, y la temperatura media anual es de 25 °C.

La belleza de Medina reside principalmente en sus impresionantes paisajes naturales, caracterizados por majestuosas montañas, ríos cristalinos y cascadas enérgicas. Sus praderas verdes y vastos campos cultivados hacen de este lugar un destino ideal para el turismo rural y el ecoturismo.

Medina alberga un tesoro de biodiversidad que merece ser apreciado y protegido. En sus territorios conviven numerosas especies de plantas, bosques y vida silvestre, que llenan nuestro entorno de colores y sonidos. En este contexto, surge la "Guía de Biodiversidad Ilustrada de Aves y Mamíferos", elaborada como parte de la línea base de biodiversidad realizada en cada una de las cinco fincas que conforman el Pentágono de la Biodiversidad, este apoyo fue realizado por la fundación TIDES.

El proyecto se desarrolla en el municipio de Medina, Cundinamarca, abarcando las veredas **Gazaduje, Periquito, El Carmen, La Bodega y San Pedro de Guajaray**. La iniciativa de conservación conocida como "Pentágono de la Biodiversidad" surge del sueño compartido por cinco mujeres propietarias de cinco fincas en dicha localidad: Clara, Marcela, Sara, Diana Maritza y Sasha, estas mujeres realizan juntos sus familias, actividades que van desde la ganadería tradicional y regenerativa hasta la agricultura orgánica y regenerativa, conservación de especies silvestres como, mono churuco, el oso palmero, mono aullador, regeneración natural y protección de los bosques. Sin embargo, más allá de las actividades que se realizan en cada finca , lo que une a estas mujeres con las demás fincas es su objetivo común: la protección del bosque, su biodiversidad e identidad cultural local.

De esta manera, surge la estrategia del "Pentágono de la Biodiversidad", que se concentra en diseñar e implementar acciones para la conservación de la biodiversidad, fomentando la valoración de la cultura local y la aplicación de métodos tradicionales de agricultura regenerativa, con la visión de replicar estos modelos en las comunidades vecinas. Este propósito se materializa mediante la creación de corredores de conectividad, los cuales favorecen a la fauna que depende de bosques saludables y libres de intervención humana para su movilidad.

Cada finca del Pentágono asume el compromiso de trasmitir sus conocimientos a las comunidades locales, específicamente a los niños de las instituciones educativas rurales del territorio , con el fin último de preservar la riqueza biológica del municipio de Medina, Cundinamarca.

Para una mejor coordinación y enfoque, el Pentágono se divide en cinco ECO-regiones, con el propósito de abarcar estratégicamente los hábitats amenazados de la fauna silvestre:

- **Región Norte:** Representada por la Finca La Ponderosa.
- **Región Cordillera:** Representada por la finca la Fortuna
- **Región Central:** Representada por la Finca El Jardín del Gazaunta.
- **Región Oriental:** Representada por la Finca San Antonio.
- **Región Sur:** Representada por Villa Oso.



REGION NORTE

1. Finca la Ponderosa



REGION CORDILLERA

3. Finca la Fortuna



REGION SUR

5. Villa Oso



REGION CENTRAL

2. Finca el Jardín del Gazaunta



REGION ORIENTAL

4. Finca San Antonio



Marginal de la selva

Carretera Marginal de la selva

Investigadores y colaboradores

Yudy Marcela López Ortiz
Sara Barbosa
Diana Vanegas
Mario Abaunza
Juan Carlos Rivas
Luis Angel López Ayala
María Cecilia Ortiz de López
Alven Gonzalez
Viviana Calderón

Ilustración

Ian Lewington.
Mark Hulme.
Hilary Burn.
Birds of the World
Juan Carlos Rivas
Hilary Burn
Jan Wilczur
Illustration by Ian Willis.
Lluís Sanz
Ian Lewington
Illustration by Ian Willis.
Tim Worfolk
Norman Arlott Arlott

Investigadores y Edición

Juan Carlos Rivas - Biólogo
Mario Abaunza - Biólogo

Agradecimientos: Fundación Tides, Familia López y todos los propietarios de fincas visitadas para el levantamiento de línea base de aves y mamíferos en el municipio de Medina, por permitir el acceso a los sitios de estudio, proveer alimentación, estadía y toda su colaboración en el proceso.

NOTA

Queda estrictamente prohibida la comercialización de esta guía. La presente guía ha sido desarrollada con fines educativos y de consulta, y su venta o distribución con fines de lucro está totalmente vetada.


MAPA FISICO DE COLOMBIA




MAPA POLITICO DE CUNDINAMARCA



MAPA FISICO DE MEDINA



BIOMAS DE CUNDINAMARCA



REGION NORTE

Finca La Ponderosa se encuentra situada en la vereda Gazaduje, en el municipio de Medina, Cundinamarca, a lo largo de la margen derecha del río Gazaduje. Con un total de 3,39 kilómetros de senderos dentro de su área, esta finca ofrece la oportunidad de explorar y observar especies en diversos hábitats, que incluyen bosques riparios, potreros, vegetación ribereña y matorrales. La altitud de la finca oscila entre los 497 y 619 metros sobre el nivel del mar.

En la Finca La Ponderosa se han diseñado cuatro senderos para facilitar la identificación de la fauna local: el Alto, el Sendero Río, el Sendero Peña, y el Sendero Manacus. Los visitantes pueden sumergirse en la belleza natural de un bosque nativo, disfrutar de las aguas cristalinas de un río con playas, y recorrer senderos especialmente marcados para la observación de aves, monos tities.



Piedemonte Amazónico - bosque húmedo con flora y fauna Amazónica.

El Sendero Pipra, con una extensión de 0,91 kilómetro, ofrece la oportunidad de identificar aves sobre la carretera, en bosques y bosques ribereños. Además, brinda la posibilidad de realizar observaciones matutinas para avistar el saltarín cola de alambre (*Pipra filicauda*), así como otras especies. Este sendero es ideal para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan experiencias únicas de avistamiento de fauna en su hábitat natural.



El Sendero Venado, con una extensión de 1,12 km, transcurre a través de, potreros y una franja de 15 ha bosque nativo, caracterizado por un dosel que puede alcanzar hasta 15 metros. Este sendero se distingue por que ofrece un gran refugio para la fauna por su buen estado de conservación y ofrece una experiencia excepcional de avistamiento de fauna. Durante el recorrido, es posible observar una amplia variedad de especies, incluyendo venados, aves entre otras.



El Sendero del Oso, con una longitud de 1,21 kilómetros, es una joya natural que ofrece a los visitantes una experiencia inolvidable en pleno contacto con la naturaleza. A lo largo de este recorrido, los amantes de la fauna y la flora tienen la oportunidad de avistar Aves de Sabana, encuentro con Osos Palmeros en algún momento entre el atardecer y el anochecer, los visitantes pueden tener la suerte de avistar osos palmeros. Estos imponentes animales, parte fundamental del ecosistema local, son una maravilla para contemplar en su hábitat natural.



Abreviaciones

Abreviaturas utilizadas en las laminas.

Hembra
Macho.....
Juvenil.....Juv.
Pichon.....P
Adulto.....Ad.
Especies.....Sp
Metros sobre el nivel del mar..... ms.n.m

Asociada a las diferentes especies

Categorías Nacional de amenaza para especies

Amenazadas	Otras categorias
VU EN Vulnerable En Peligro	NT DD LC Casi Amenazado Datos deficientes Preocupación menor

E Endémica: Exclusiva de Colombia.
I Introducida: Población exótica, con poblaciones silvestres en Colombia.
CE Casi endémica: Especies a las que parte de su distribución se encuentra en Colombia y en otros paises.

Migración y comportamiento

MA Mp Migratoria austral Migratoria parcial
MB Migratoria boreal
Nocturna
Diurna

Alimentación

Granívoro
Frugívoro
Insectívoro
Carnívoro
Nectarívoro
Omnivíro
Carroñero
Piscívoro
Herbívoro

Hábitat

Bosque	Sabanas
Rebalse	Rios, caños, humedales y lagunas
Morichal	Afloramientos rocosos
Vegetación secundaria	Areas urbanas

Elementos para identificar fauna

Binoculares 8x42 o 10x42 y o camara fotografica
Guia de fauna, libreta de apuntes
iNaturalist eBird The Cornell Lab of Ornithology Descarga las aplicaciones, Ebird, Merlin, enaturalist y xenocanto.
Ropa adecuada, sombrero o gorra, botas.

Frecuencia de Avistamiento

Alta
Media
Baja
Rara
Sonido

CINEREOUS TINAMOU

Crypturellus cinereus
ms.n.m 100-500

Tamaño 31cm/12in










Común por voz, pero se ve con poca frecuencia en bosques inundados de aguas bajas y drenajes lentos de aguas revalsadas en todo el continente en el este, rara vez en grandes islas fluviales. Suele encontrarse en un sotobosque denso, donde reacciona rápidamente a las perturbaciones y pasa fácilmente desapercibido.

Camina a lo largo de vegetación caída, a menudo flotante, en bosques inundados, donde es difícil perseguirlo; generalmente parece completamente oscuro.



Orden: Tinamiforme Familia: Tinamidae

SPECKLED CHACHALACA

Ortalis guttata
ms.n.m100-1800

Tamaño 50cm/20in










Común, vocal y visible en todo tipo de bosques y bordes de bosques en el este, extendiéndose hasta las estribaciones y, en algunos lugares, en los subtrópicos bajos.



Orden: Galliformes Familia: Cracidae

GREY-FRONTED DOVE

Leptotila rufaxilla

ms.n.m 200-800

Tamaño 27cm/11in



Común en tierras bajas y estribaciones. Suelo forestal del este, a menudo cerca del agua y generalmente no en el bosque de tierra firme bien drenado del Amazonas; vocal pero difícil de observar. Solitario o en parejas.



BLUE GROUND-DOVE


Claravis pretiosa

ms.n.m 0-2400

Tamaño 32cm/13in



Común en tierras bajas y estribaciones. Suelo forestal del este, a menudo cerca del agua y generalmente no en el bosque de tierra firme bien drenado del Amazonas; vocal pero difícil de observar. Solitario o en parejas.



PALE-VENTED PIGEON


Patagioenas cayennensis

ms.n.m 100-800

Tamaño 32cm/13in



Paloma grande de sabanas inundables, riveras, áreas abiertas con árboles intercalados, localmente en algunos pueblos.



BLUE GROUND-DOVE

Patagioenas speciosa

ms.n.m 0-1200

Tamaño 33cm/13in



Paloma bien parecida de bosques húmedos y sus bordes en tierras bajas. Usualmente se observa sobrevolando, es menos común verla perchando en el dosel en árboles altos. En vuelo note el vientre blanco que contrasta con la parte inferior de la cola oscura.



SMOOTH-BILLED ANI

Crotophaga ani

ms.n.m 0-2800

Tamaño 45cm/18in



Los garrapateros son cucús muy raros color negro carbón, con colas largas flexibles y picos únicos muy profundos con las caras laterales muy amplias. Se encuentran en tierras bajas tropicales y laderas en una gran variedad de hábitats abiertos y semiabiertos. Groove-billed Ani es muy parecido a Smooth-billed. En la mayoría de los lugares solo se encuentra una especie, pero ambas se encuentran entre Nicaragua y Venezuela. Smooth-billed es ligeramente más grande con los lados del pico lisos. Los llamados típicos de ambas especies son diferentes, Smooth-billed tiene un pequeño silbido-grito parecido a un halcón.



SQUIRREL CUCKOO

Piaya cayana

ms.n.m 0-2800

Tamaño 45cm/18in



Generalmente se alimenta sigilosamente en los estratos medios y altos de los árboles, donde puede ser sorprendentemente difícil de ver. Puede encontrarse atravesando en picada los caminos, causando sorpresa. La parte inferior de las plumas de la cola, que tienen puntas blancas, es canela en el Oeste de México y negra en las demás regiones.



Suele verse en parvadas, a veces asociado con golondrinas u otros vencejos. Parece ser negro a menos que se le vea a corta distancia, siendo entonces posible ver el collar castaño (ausente en los inmaduros).


Generalmente se ve en bandadas, a veces bastante grandes, alimentándose sobre hábitats como bosques, claros, áreas abiertas y lagos.

CHESTNUT-COLLARED SWIFT

Streptoprocne rutila

ms.n.m 800-2800

Tamaño 14cm/5 1/2in




GREY-RUMPED SWIFT

Chaetura cinereiventris

ms.n.m 1000-2500

Tamaño 11cm/4in



RUFIOUS-BREASTED HERMIT

Glaucis hirsutus
ms.n.m 0-1100
Tamaño 10cm/4in





Bastante común en crecimiento secundario espeso en tierras bajas y estribaciones; cerca del agua en la Amazonia, no tan estrictamente en Magdalena. Visita Heliconia.



GLITTERING-THROATED EMERALD

Chionomesa fimbriata
ms.n.m 100-1200
Tamaño 8.5cm/3 1/4in





Común en el borde del bosque, áreas semiabiertas, plantaciones y jardines en las estribaciones y tierras bajas del este. Generalmente se encuentra bajo.




SOUTHERN LAPWING

Vanellus chilensis
ms.n.m 0-2600
Tamaño 35cm/14in





Común en pastizales de tierras bajas del norte y este, con menos frecuencia en bancos de arena; Cada vez es más común en las tierras altas, en pueblos, parques y terrenos en barbecho. Grupos pequeños; vocal cuando se le molesta y cuando vuela.



SUNBITTERN

Eurypyga helias

ms.n.m 0-1830

Tamaño 50cm/20in



LC



Encontrado solo o en pares a lo largo de ríos o pantanos, generalmente de pie y en silencio cerca de la orilla. Escucha pors sus silbidos largos en el amanecer y el anochecer.




WHISTLING HERON

Syrigma sibilatrix

ms.n.m 0-400


Tamaño 58cm/23in



LC



Garza multicolor, con una gorra oscura, cuello pálido y un pico rosado con punta negra que contrasta con su anillo ocular azul



Amplia y abundante, pastos y praderas, a menudo no cerca del agua; no acuático; gregario, recoge presas terrestres móvil, llamativo, a menudo con ganado.

CATTLE EGRET


Bubulcus ibis

ms.n.m 0-800

Tamaño 50cm/20in



LC



LITTLE BLUE HERON

Egretta caerulea

ms.n.m 0-2800

Tamaño 62cm/25in



LC



Garza oscura de tamaño mediano. El pico largo es azul pálido en la base y más oscuro en la punta. Los adultos son mayormente azul grisáceo, con la cabeza y el cuello color morado que contrasta con el cuerpo.



GREAT EGRET


Ardea alba

ms.n.m 0-1500

Tamaño 100cm/40in



LC



SCARLET IBIS

Eudocimus ruber

ms.n.m 0-600

Tamaño 60cm/24in



Inconfundible, hermoso ibis rojo anaranjado con las puntas de las alas negras. Los adultos en plumaje reproductivo tienen picos negros. El pico es rosado en otros períodos. Los inmaduros son oscuros arriba con vientres blancos y picos rosados. Restringido a manglares y estuarios fangosos adyacentes.



GREEN IBIS

Mesembrinibis cayennensis

ms.n.m 0-800

Tamaño 58cm/23in



Localmente bastante común a lo largo de arroyos y lagos boscosos en el norte y el este, más ligado al bosque que otros ibis, no a menudo en espacios abiertos; La mayoría de las veces se localiza al sonar el canto del amanecer.




BARE-FACED IBIS

Phimosus infuscatus

ms.n.m 0-2600

Tamaño 52cm/21in



Los ibis vistos con mayor frecuencia en Colombia, campos, pantanos, áreas abiertas inundadas, pero no áreas densamente boscosas o manglares; Grupos grandes, se asocia libremente con otras aves. Poco frecuente en altitudes más altas.



BLACK VULTURE


Coragyps atratus

ms.n.m 0-3600

Tamaño 65cm/25in



Omnipresente, común y visible en todas partes; gregarios, en grandes cantidades se reúnen en corrientes ascendentes en las tierras bajas.



TURKEY VULTURE

Cathartes aura

ms.n.m 0-3400

Tamaño 75cm/30in



Común en todas partes; en el sureste, principalmente en las estribaciones, y se extienden únicamente a lo largo de los ríos principales.



Común y conspicuo en tierras bajas y estribaciones, bosques y áreas abiertas, a veces planeando en grandes grupos o con buitres. Captura insectos voladores en vuelo. Puede asociarse con el milano de cola bifurcada.

PLUMBEOUS KITE

Ictinia plumbea

ms.n.m 100-2500

Tamaño 38cm/15in




Orden: Accipitriformes Familia: Accipitridae

ROADSIDE HAWK

Rupornis magnirostris

ms.n.m 0-3000

Tamaño 38cm/15in



Un halcón común en tierras bajas y bosques subtropicales y áreas perturbadas. A menudo se le ve deslizándose por áreas abiertas, pero no sueña con regularidad; cola generalmente cerrada en vuelo.

AMAZONIAN MOTMOT

Momotus momota

ms.n.m 200-1400

Tamaño 40cm/16in



Generalmente lo más común tragón en bosques de tierras bajas en el este, visto en tierra firme, bosques inundados y ribereños en todas las alturas. Anteriormente incluido en Trogón de cola blanca.


Orden: Coraciiformes Familia: Momotidae

RINGED KINGFISHER

Megaceryle torquata

ms.n.m 0-2500

Tamaño 40cm/16in



Común en lagos y ríos abiertos más grandes en tierras bajas y deambulando hacia tierras altas; raramente en agua salada. Prefiere aguas más abiertas que el martín pescador Chloroceryle. A veces flota cuando pesca; descansa sobre cables.

Orden: Coraciiformes Familia: Alcedinidae

Localmente bastante poco común en crecimiento a orillas del agua, como densos rodales de bambú, a lo largo de los principales ríos en las tierras bajas del este.

BROWN JACAMAR

Brachygalba lugubris

ms.n.m 200-1200
Tamaño 16cm/6 1/2 in



Bastante común a poco común en Aberturas pantanosas en bosques inundados de aguas negras y pantanos de palmeras inundados cerca de ríos más grandes en las tierras bajas del Amazonas del este. Se posa en troncos bajos y sale para cazar insectos.

WHITE-CHINNED JACAMAR

Galbula tombacea

ms.n.m 100-1200
Tamaño 23cm/9 in




GILDED BARBET

Capito auratus

ms.n.m 200-1200
Tamaño 16cm/6 1/2 in



Barbudo grande y contrastantemente marcado del bosque lluvioso de tierras bajas. El plumaje es variable: la garganta y el pecho varían de amarillo a rojo, mientras que el resto del cuerpo está marcado en amarillo y negro. Se encuentra en una variedad de hábitats desde el borde del bosque hasta el bosque lluvioso maduro.



WHITE-THROATED TOUCAN

Ramphastos tucanus

ms.n.m 200-1300
Tamaño 57cm/23 in



Común y familiar en bosques de todo tipo de tierras bajas y estribaciones orientales, algunos en los subtrópicos inferiores. Busca alimento durante el día cerca del dosel, generalmente sentado para cantar al amanecer y al anochecer.

Bastante común, sobre todo en bosques ribereños de tierras bajas y estribaciones del este; Visita islas fluviales. Busca alimento en parejas y en grupos pequeños y activos.

CHESTNUT-EARED ARACARI

Pteroglossus castanotis

ms.n.m 100-1200
Tamaño 45cm/18 in



Orden: Piciformes Familia: Galbulidae

Orden: Coraciiformes Familia: Momotidae

Orden: Piciformes Familia: Ramphastidae

Común en hábitats secundarios más secos en tierras bajas del este hasta los subtrópicos; también en el Catatumbo y la sierra de Santa Marta. Busca alimento en alturas bajas o medias, a menudo con bandadas mixtas.

SCALED PICULET

Picumnus squamulatus

ms.n.m 100-1900

Tamaño 9cm/3 1/2 in



LC



Pájaro carpintero escandaloso y colorido de los bosques de tierras bajas. Su contrastante coloración negra y amarilla es distintiva. Frecuentemente se percha en tocones altos en el bosque maduro y el bosque secundario.

YELLOW-TUFTED WOODPECKER

Melanerpes cruentatus

ms.n.m 100-1200

Tamaño 19cm/7 1/2 in



LC



Común en secundaria y bosque semiabierto, plantaciones arboladas maduras. Generalmente en parejas dispersas que prefieren troncos más grandes. Puede ocurrir junto con pájaros carpinteros Campephilus similares.

LINEATED WOODPECKER

Dryocopus lineatus

ms.n.m 0-2200

Tamaño 35cm/14 in



LC



No planea. Vuela con prisa y aleteos tensos, exponiendo sus manchas color cobre bajo las alas. Su llamado parece una carcajada a lo lejos.

LAUGHING FALCON

Herpetotheres cachinnans

ms.n.m 0-2500

Tamaño 50cm/20in



Áreas abiertas en el norte y al este, a menudo a lo largo de ríos, bancos de arena, nunca bosques; grupos; busca y mata cosas fáciles.

YELLOW-HEADED CARACARA

Daptrius chimachima

ms.n.m 0-3000

Tamaño 44cm/18in



CRESTED CARACARA

Caracara plancus

ms.n.m Carancho Norteño

Tamaño 56cm/22in



Rapaz grande y patilarga de hábitats abiertos. A menudo se desplaza por el suelo o se posa visiblemente en algún poste de cerramiento o de electricidad.



COBALT-WINGED PARAKEET

Brotogeris cyanoptera

ms.n.m 0-900

Tamaño 20cm/8in



Periquito verde con una cola corta. Las plumas azules del ala son difíciles de ver cuando están perchados, pero son conspicuas en vuelo.




SPECTACLED PARROTLET

Forpus conspicillatus

ms.n.m200-23000

Tamaño 12cm/5in



Más bien local en el sotobosque de los bosques y en los bordes de los bosques con matorrales en las estribaciones nororientales y las tierras bajas adyacentes. Generalmente en parejas, rara vez se unen a bandadas mixtas.

NORTHERN SLATY-ANTSHRIKE

Thamnophilus punctatus

ms.n.m 200-1500

Tamaño 15cm/6in




Esta ave merodeadora vive en tierras bajas tropicales húmedas, prefiriendo matorrales y zarzales en bordes de bosque al lado de corrientes de agua. Su canto de silbidos aflautados suele escucharse y revelar su presencia, generalmente en parejas aunque son difíciles de ver claramente.

DUSKY ANTbird

Cercomacroides tyrannina

ms.n.m 0-1900

Tamaño 15cm/6in




Hormiguero pequeño, de cola corta con una ceja contrastante. El macho es gris plateado con cejas blancas brillantes. La hembra es marrón arriba y blanca abajo con una cara negra y una ceja anaranjada. Se encuentra en bosques jóvenes y en bordes de bosques, escondido entre la maleza densa solo o en parejas. Escucha por una larga serie de silbidos ásperos y descendentes.

WHITE-BROWED ANTbird

Myrmoborus leucophrys

ms.n.m 100-1700

Tamaño 13.5cm/5 1/4i




Común en bosques húmedos de las tierras bajas y estribaciones, localmente más alto, en casi todas partes. Sigue bandadas mixtas, hormigas y tropas de monos, y generalmente permanece agachado en el bosque.

PLAIN-BROWN
WOODCREEPER

Dendrocincla fuliginosa

ms.n.m 0-1200

Tamaño 20cm/8in



Común en bosques de tierras bajas del este y norte, bosques de borde y secundarios, palmares, siempre cerca del agua en tierras bajas amazónicas. A veces se une a bandadas mixtas.

STRAIGHT-BILLED
WOODCREEPER

Dendroplex picus

ms.n.m 100-1300

Tamaño 20cm/8in



Hojarasquero común de vegetación densa y bordes de bosque. Marrón rojizo con ojos anaranjados pálidos y pico grueso recto. Prefiere los bordes de bosques, bosques jóvenes, y orillas de arroyos y ríos. Extremadamente discreto y difícil de ver a medida que forrajea en la vegetación densa y enredaderas solos o en pares.

CHESTNUT-
CROWNED
FOLIAGEGLENER

Automolus rufipileatus

ms.n.m 100-1300

Tamaño 19cm/7 1/2 in



Hojarasquero común de vegetación densa y bordes de bosque. Marrón rojizo con ojos anaranjados pálidos y pico grueso recto. Prefiere los bordes de bosques, bosques jóvenes, y orillas de arroyos y ríos. Extremadamente discreto y difícil de ver a medida que forrajea en la vegetación densa y enredaderas solos o en pares. La coloración marrón rojiza y el ojo claro ayudan a distinguirlo de otros hojarasqueros. El canto a menudo se escucha al amanecer, un trino descendente de aproximadamente un segundo de duración.

DUSKY SPINETAIL

Synallaxis moesta

ms.n.m 250-1350

Tamaño 15cm/6in



Común en el sotobosque espeso y enredado del bosque húmedo localmente hasta las estribaciones; leks 1-2m arriba.

Orden: Passeriformes Familia: Pipridae

WHITE-BEARDED MANAKIN

Manacus manacus

ms.n.m 0-1000

Tamaño 11cm/4 1/2in




Saltarín espectacular con filamentos caudales muy largos y ojos blancos penetrantes. El macho es amarillo brillante desde la cara hasta la región ventral y rojo brillante desde la corona hasta el manto; por lo demás es negro. La hembra es verde oliva opaco con un matiz amarillo en la barbilla y el pecho y tiene los filamentos caudales más cortos. Normalmente presente cerca de arroyos en bosques húmedos, incluyendo los bosques de galería y el bosque secundario maduro.

WIRE-TAILED MANAKIN

Pipra filicauda

ms.n.m 200-500

Tamaño 12cm/4 3/4in



Bastante común en dosel de bosques alterados y semiabiertos hasta los subtrópicos inferiores; a menudo se posa sobre troncos.


Cabezón mediano, encontrado en bordes de bosques húmedos, zonas boscosas y bosques de galería donde tiende a posarse en ramas expuestas.

BLACK-CROWNED TITYRA

Tityra inquisitor

ms.n.m 0-1200

Tamaño 18cm/7in





WHITE-WINGED BECARD

Pachyramphus polychopterus

ms.n.m 0-2000

Tamaño 15cm/6in




Orden: Passeriformes Familia: Tityridae

Mosquerito sencillo e inconspicuo de bosques tropicales húmedos, deambula también en claros cercanos y áreas semiabiertas con árboles y arbustos con frutas. Usualmente se encuentra solo a niveles bajos y medios en sotobosques sombreados y a veces con parvadas de alimentación mixtas.

OCHRE-BELLIED
FRUIT-TYRANT

Mionectes oleagineus

ms.n.m 0-1300
Tamaño 13cm/51/4in



Poco común y local en el sotobosque de las tierras bajas y laderas cercanas al este y norte, reemplazado por las siguientes especies en el bosque montano. Se une brevemente a bandadas mixtas.

SEPIA-CAPPED
FLYCATCHER

Leptopogon amaurocephalus

ms.n.m 0-1300
Tamaño 13cm/51/4in



Bastante común pero poco visible en marañas de bosques más secos y áreas de borde y ligeramente boscosas en el norte, llanos y el Valle del Magdalena. No se une a bandadas mixtas. Generalmente se escucha antes que se ve.

PALE-EYED
PYGMY-TYRANT

Atalotriccus pilaris

ms.n.m 100-800
Tamaño 11cm/41/4in



COMMON TODY-
FLYCATCHER

Todirostrum cinereum

ms.n.m 0-2200
Tamaño 9.5cm/33/4in




Común en áreas ligeramente boscosas o áreas de arbustos y bordes de bosques desde las tierras bajas hasta los subtrópicos inferiores en casi todas partes. A menudo es solitario, pero brevemente se une a bandadas mixtas.

Mosquero más abultado pero pequeño, común en las zonas tropicales de baja altitud. Suele encontrarse en claros cubiertos de malezas, sabanas, y otras áreas semi-abiertas con arbustos dispersos.

SOUTHERN
BEARDLESS-
TYRANNULET

Camptostoma obsoletum

ms.n.m 0-1500
Tamaño 10cm/4in



YELLOW-BELLIED
ELAENIA

Elaenia flavogaster

ms.n.m 0-2500
Tamaño 16cm/61/2in



Mosquero marrón grisáceo encontrado en áreas boscosas y bordes de bosque. Es usualmente visto en una percha alta, vigilando por presas y saliendo a capturar insectos.

WESTERN WOOD-PEWEE

Contopus virens

ms.n.m 0-1500
Tamaño 14.5cm/53/4i





Grande, fuertemente marcado y bullicioso. Bastante rechoncho con cabeza grande y cola corta. Se encuentra en áreas llenas de arbustos, a menudo cerca de zonas abiertas o cuerpos de agua.

GREAT KISKADEE

Pitangus sulphuratus

ms.n.m 0-1600
Tamaño s 20cm/8in




Flycatcher grande de vientre amarillo con cabeza gris, espalda verdosa y alas y cola marrones. Pico relativamente largo. Casi idéntico a Couch's Kingbird y muy similar a otros kingbirds de vientre amarillo.

TROPICAL KINGBIRD

Tyrannus melancholicus

ms.n.m 0-2800
Tamaño 22cm/83/4in



BROWN-CRESTED FLYCATCHER

Myiarchus tyrannulus

ms.n.m 0-1700
Tamaño 20cm/8in



Migratorio de verano poco común en tierras bajas tropicales y estribaciones. Prefiere bordes de bosques, plantaciones y claros con árboles altos.

PIRATIC FLYCATCHER

Legatus leucophaeus


ms.n.m 0-1600
Tamaño 15cm/6in



Uniformemente verde oliva arriba, blancuzco abajo y sin barras alares. El rojo de los ojos en los adultos no siempre es fácil de ver; los inmaduros tienen ojos marrones. Línea oscura a través de y arriba del ojo. Pico más grueso que las reinitas, cuerpo casi del mismo tamaño. Se encuentra en áreas boscosas con árboles caducifolios. Tiende a cantar más tarde en el día que otras aves canoras.

RED-EYED VIREO

Vireo olivaceus
ms.n.m 100-500
Tamaño 14.5cm/53/4in



Ave grande y oscura con un plumaje azul vibrante y una cabeza y un babero negros. Frecuenta una variedad de hábitats abiertos, incluyendo bordes de bosques, jardines y áreas agrícolas. A menudo es particularmente común en la vegetación a lo largo de ríos y caminos acuáticos. Se distingue de la similar Purplish Jay por su brillante plumaje azul y su contraste nuca pálida. También escucha por un penetrante y agudo "jiir".

VIOLACEOUS JAY

Cyanocorax violaceus
ms.n.m 200-1350
Tamaño 36cm/14in



Pájaro muy pequeño de bosque húmedo tropical y bordes. Prefiere las enredaderas en los niveles medios superiores, donde se mueve activamente, manteniendo la cola levantada y moviéndola de lado a lado. Su apariencia es distintiva, con la cara beige, pico delgado muy largo y cola bastante larga con puntas blancas. Similar a Chattering Gnatwren pero carece de las manchas blancas adicionales en las plumas externas de la cola. Fácilmente se pasa por alto, pero el canto que sube y baja revela su presencia.

LONG-BILLED GNATWREN

Ramphocaenus melanurus
ms.n.m 100-750
Tamaño 12cm/43/4in



En casa en los suburbios, parques, granjas y otras áreas abiertas con matorrales densos. En la temporada de reproducción, a menudo está cantando su canto efervescente desde la parte superior de un arbusto o un poste de la cerca.

HOUSE WREN

Troglodytes aedon

ms.n.m 0-3200

Tamaño 12cm/43/4in





RUFIOUS-BREASTED WREN

Pheugopedius rutilus

ms.n.m 0-1900

Tamaño 14cm/51/2in



Saltapared atractivo y de tamaño mediano, de tierras bajas tropicales y estribaciones. Prefiere bosques y bordes, plantaciones y matorrales, con frecuencia cerca del agua.

RUFIOUS-AND-WHITE WREN

Thryophilus rufalbus

ms.n.m 0-1500

Tamaño 15cm/51/2in



Un soterrey de tamaño medio encontrado desde el este de Panamá a lo largo de gran parte de las tierras bajas de Suramérica. Tiene las partes superiores cálidas, medio marrones, con barras oscuras en las alas y la cola. Las pálidas mejillas y garganta blancuzcas se desvanecen en un vientre beige.

BUFF-BREASTED WREN

Cantorchilus leucotis

ms.n.m 0-600

Tamaño 14cm/51/2in




Un zorzal de pocos colores, común en hábitats abiertos y arboledas en las tierras bajas, pero también vagabundea en las estribaciones andinas. Mayormente marrón-grisáceo con el vientre blancuzco.

BLACK-BILLED THRUSH

Turdus ignobilis

ms.n.m 200-2600
Tamaño 23cm/9in



SWAINSON'S THRUSH

Catharus ustulatus

ms.n.m 0-3000
Tamaño 23cm/9in



Orden: Passeriformes Familia: Turdidae


Ave diminuta con pico robusto y cola corta. Los machos tienen la cabeza, la espalda y la garganta de color negro azulado brillante, su frente y su vientre amarillo brillante y su cola blanca. Las hembras son verde-oliva por encima con el vientre amarillento o blanco, el cual está flanqueado de amarillo dependiendo de su rango de distribución.

PURPLE-THROATED EUPHONIA

Euphonia chlorotica

ms.n.m 200-500

Tamaño 10cm/4in



Orden: Passeriformes Familia: Fringillidae


Bastante común pero poco visible en el sotobosque de los bosques; en o cerca del suelo.

PECTORAL SPARROW

Arremon taciturnus

ms.n.m 100-1100

Tamaño 16cm/6 1/4in



Orden: Passeriformes Familia: Passerellidae

Este atractivo tordo se encuentra en áreas abiertas. A menudo se percha visiblemente sobre el zacate o pequeños arbustos. El macho es inconfundible, mayormente negro con el pecho y la garganta rojo brillantes. La hembra es menos llamativa.

RED-BREASTED BLACKBIRD

Leistes militaris

ms.n.m 0-1600

Tamaño 46cm/18in




Común y notable principalmente en cubierta forestal de tierras bajas y estribaciones; grande grupos, con bandadas mixtas de oropéndolas.

CRESTED OROPENDOLA

Psarocolius decumanus

ms.n.m 0-2600

Tamaño 46cm/18in



Común en bosques húmedos y bordes, principalmente en Tierras Bajas; grupos conspicuos, a menudo con oropéndolas.

YELLOW-RUMPED CACIQUE

Cacicus cela

ms.n.m 0-3500

Tamaño 28cm/11in




Un vaquero bastante grande de tierras bajas tropicales. El macho es mucho más grande que la hembra. Se encuentra en los bordes de bosques, pastizales, plantaciones y áreas abiertas a lo largo de ríos; a menudo en grupos pequeños. En temporada de reproducción, merodea las colonias de oropendola. (Pone sus huevos en los nidos de las oropendolas y depende de ellas para criar a su descendencia.)

GIANT COWBIRD

Molothrus oryzivorus

ms.n.m 100-2000

Tamaño 38cm/15in



Migrante boreal común hacia los bordes de los bosques y las plantaciones; con bandadas mixtas del sotobosque. Se reproduce en bosques caducifolios (maduros y secundarios). Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

AMERICAN REDSTART
Setophaga ruticilla
ms.n.m 0-3000
Tamaño 12.5cm/5in

LC

MB

Las aves en plumaje no reproductivo y las hembras son más opacas; pero la mayoría muestran al menos un poco de color castaño en los lados. Las aves más opacas son parecidas a Blackpoll y Pine Warblers; observa las estrías en la espalda, barras del ala bien definidas, cabeza y cuello amarillo verdoso más uniforme.

BAY-BREASTED WARBLER
Setophaga castanea
ms.n.m 0-1000
Tamaño 13cm/5in

LC

MB

Migrante boreal común hacia los bordes de los bosques y las plantaciones; con bandadas mixtas del sotobosque. Se reproduce en bosques caducifolios (maduros y secundarios). Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

BLACKPOLL WARBLER
Setophaga striata
ms.n.m 300-3000
Tamaño 12.5cm/5in

NT

MB

Un abundante migrante boreal en bosque y borde del bosque; con bandadas mixtas. Se reproduce en áreas boscosas, que van desde bosques de pino-roble en el sureste de Estados Unidos hasta corredores riparios en el norte de México y oeste de EE.UU. Pasa el invierno en Centro y Suramérica.

SUMMER TANAGER
Piranga rubra
ms.n.m 0-1800
Tamaño 18cm/7in

LC

MB

Orden: Passeriformes Familia: Parulidae


Orden: Passeriformes Familia: Cardinalidae

SILVER-BEAKED TANAGER

Ramphocelus carbo

ms.n.m 100-1200

Tamaño 17cm/63⁄4in



Una támara común del sotobosque de áreas suburbanas y bordes de bosque. El brillante pico plateado se destaca en los machos rojo y negro, pero el pico gris de las hembras e inmaduros uniformemente granate es menos obvio.




MAGPIE TANAGER

Cissopis leverianus

ms.n.m 200-1900

Tamaño 25cm/10in



Se encuentra en los bordes del bosque, plantaciones, claros y jardines; ocasionalmente se une a bandadas de especies mixtas.




WHITE-SHOULDERED TANAGER

Loriotus luctuosus

ms.n.m 100-1000

Tamaño 14cm/51⁄2in



Tangara pequeña con marcado dimorfismo sexual: el macho es totalmente negro con un parche blanco contrastante en el hombro, la hembra es oliva arriba y amarillo abajo con la cabeza gris. El macho es más parecido a White-lined Tanager pero es más pequeño con el hombro blanco mucho más obvio.





Un generalista de hábitat, se encuentra en una variedad de áreas abiertas con arbustos, jardines o bordes de bosques. Usualmente en parejas o pequeñas bandadas, a veces mezclados con otras especies. A menudo bastante ruidoso y conspicuo, emite una serie de chirridos o una sola llamada nasal "swii?".

PALM TANAGER

Thraupis palmarum

ms.n.m 0-2200

Tamaño 16cm/6 1/2 in




BLUE-GREY TANAGER

Thraupis episcopus

ms.n.m 0-2600

Tamaño 16cm/6 1/2 in




Se percha en posición vertical, a menudo en ramas expuestas o en las copas de árboles, y sale en busca de insectos como un mosquero. Usualmente se ve en parejas o pequeños grupos dispersos. Se encuentra en los bordes del bosque, claros o jardines.

SWALLOW TANAGER

Tersina viridis

ms.n.m 0-2800

Tamaño 13.5cm/5 1/4 in




Usualmente se ven en pares o pequeños grupos en el dosel de bosques, bordes y bosque secundario. A menudo sigue bandadas de forrajeo de especies mixtas. Se alimenta de frutas.

BLUE DACNIS

Dacnis cayana

ms.n.m 0-1100

Tamaño 12.5cm/5 in





CHESTNUT-VENTED CONEBILL

Conirostrum speciosum

ms.n.m 100-700

Tamaño 11cm/4 1/2 in



hábitats naturales: el dosel y los bordes se bosques húmedos tropicales y subtropicales, bosques en galería, sabanas, jardines


Ampliamente distribuido y común pero con distribución irregular. El macho es amarillo brillante saturado de anaranjado en la frente. Típicamente, muestra tonos menos marrón-oliva en la espalda y las alas que muchos yellowfinches, pero las poblaciones sureñas de Saffron son más opacas y más marrones arriba. Las hembras son más opacas que los machos, con las poblaciones sureñas incluso más marrones y rayadas. Podría confundirse con Grassland Yellowfinch, pero esa especie suele ser más opaca y más rayada. Orange-fronted Yellowfinch es más pequeño. Saffron Finch se encuentra en hábitats abiertos y secos, incluyendo áreas agrícolas y pueblos. A menudo en bandadas.

SAFFRON FINCH


Sicalis flaveola

ms.n.m 0-2700

Tamaño 13cm/5in



LC



Bastante común en tierras bajas tropicales húmedas. Prefiere bordes de bosques, plantaciones y bosque secundario denso. Usualmente visto solo o en pares, alimentándose tranquilamente en árboles en flor o en fructificación.

BUFF-THROATED
SALTATOR


Saltator maximus

ms.n.m 100-1700

Tamaño 21cm/8 1/2in



LC



MAMIFEROS


Este armadillo relativamente grande está restringido a los bosques tropicales húmedos de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. En las zonas de sabana está restringido a los parches de bosque. La especie construye madrigueras en suelo bien drenado. Las hembras suelen dar a luz a dos crías (Eisenberg 1989).

ARMADILLO DE NARIZ GRANDE

Dasypus kappleri

ms.n.m 200-1250

Tamaño 51 a 58 cm



LC




Las pacas tienen hábitos nocturnos. Van solitarias o en parejas. Se alimentan de vegetales (tubérculos, rizomas, vástagos, hojas, semillas, frutos). Pasan el día en su madriguera construida con varias salidas disimuladas por el follaje. No se alejan demasiado de sus madrigueras y son animales territoriales. Son excelentes corredoras y nadadoras.

LAPA

Cuniculus paca

ms.n.m 0-2000

Tamaño 60 a 79 cm



LC



Los nidos pueden ser contruidos con hojas (Nitikman, 1985). El periodo de gestación y lactancia dura entre 15 y 16 semanas. Las crías nacen sin pelo y con los ojos cerrados. El número de embriones puede ser de dos o tres (Enders, 1935; Nitikman, 1985). La reproducción podría depender de la disponibilidad de frutos (Glanz et al., 1982). Un individuo se registró con una duración de vida de hasta seis años (Nitikman, 1985).

ARDILLA DE COLA ROJA

Sciurus granatensis

ms.n.m 0-3700

Tamaño 22 cm



LC



Orden: Cingulata Familia: Dasypodidae

Orden: Rodentia Familia: Cuniculidae

Orden: Rodentia Familia: Sciuridae

MAMIFEROS

El oso hormiguero gigante se encuentra en gran variedad de hábitats, en sabanas, pastizales, áreas pantanosas, bosques húmedos, bosques secos, siendo más frecuente en áreas abiertas con abundancia de hormigas y termitas, las cuales componen esencialmente su dieta (mirmecofagia).

OSO PALMERO
Myrmecophaga tridactyla
ms.n.m 0-2000
Tamaño 50 a 180 cm







Por lo general se congregan en grupos que en promedio tienen 6 animales, pero se han observados en grupos más grandes de hasta 16 individuos, en territorios de entre 4 y 182 ha. Adoptan principalmente la posición cuadrúpeda y lo hacen en un 80% de las veces mientras se desplazan.

MONO TITI
Saimiri cassiquiarensis albigena
ms.n.m 200-1200
Tamaño 25 a 37 cm







Son crepusculares y nocturnos, su principal alimento son frutos, especialmente de palmas, aunque también consumen semillas, algunas hierbas y tubérculos. Se adaptan muy bien a las modificaciones introducidas por el hombre, aunque son intensamente cazados por su carne.

ÑEQUE
Dasyprocta fuliginosa
ms.n.m 200-1600
Tamaño 54 a 76 cm







Orden: Pilosa Familia: Myrmecophagidae

Orden: Primates Familia: Atelidae

Orden: Rodentia Familia: Dasyproctidae

MAMIFEROS


Se ha registrado que pueden tener dos camadas de tres a seis cachorros por año con un intervalo de nacimientos de siete a ocho meses. Se sugiere que tienen picos de nacimiento en Enero y Agosto. Ambos sexos alcanzan la madurez sexual al año de vida. El levantamiento de la pata al orinar indica la madurez alcanzada, en ambos sexos.

ZORRO


Cerdocyon thous

ms.n.m 0-3000

Tamaño 65 cm



LC




Son crepusculares y nocturnos, su principal alimento son frutos, especialmente de palmas, aunque también consumen semillas, algunas hierbas y tubérculos. Se adaptan muy bien a las modificaciones introducidas por el hombre, aunque son intensamente cazados por su carne.

YAGUARUNDI

Herpailurus yagouaroundi

ms.n.m 0-3200

Tamaño 70 cm



LC




En su hábitat, es uno de los carnívoros más importantes de su cadena trófica, puesto que utiliza hábitats que no pueden usar el jaguar y el puma, alimentándose de poblaciones de especies más pequeñas. Está asociado a hábitats de vegetación densa y coberturas boscosas. Necesita zonas amplias para vivir. Puede habitar una gran cantidad de ecosistemas: bosques de manglares, pantanos costeros, praderas de sabanas, pastizales, matorrales espinosos y bosques tropicales de todo tipo.

TIGRILLO


Leopardus pardalis

ms.n.m 0-3000

Tamaño 70 - 90 cm



LC



MAMIFEROS

Las hembras están en celo durante la segunda mitad del otoño. Los machos compiten por ellas y se enfrentan en combates uno contra otro. Un macho copula con cuantas hembras le es posible. Tras siete meses de gestación, nacen desde una hasta tres crías.

VENADO DE COLA BLANCA

Odocoileus virginianus

ms.n.m 0-4500

Tamaño 95 – 220 cm



Orden: Artiodactyla Familia: Cervidae

[illegible]

Registro de aves en la finca

[illegible]

NOTAS

Registro de mamíferos en la finca


A large, light gray silhouette of a sloth is positioned on the right side of the slide, extending from the center towards the right edge. The sloth is depicted in a walking or standing posture, facing right. Its long, curved arm is visible, and its tail is long and slightly curled. The silhouette is semi-transparent, allowing the background to show through it.

NOTAS


Registro de mamíferos en la finca

A large, light gray silhouette of a sloth is positioned on the right side of the slide, extending from the center towards the right edge. The sloth is depicted in a walking or standing posture, facing right. Its long, curved arm is visible, and its tail is long and slightly curled. The silhouette is semi-transparent, allowing the background to show through it.[illegible]

NOTAS



NOTAS



NOTAS

